



L'INSÉPARABLE (AGAPORNIS SPP.)

Ce petit psittacidé est originaire d'Afrique. Contrairement à ce que son nom suggère, un inséparable peut vivre seul, à condition que son propriétaire lui accorde du temps et de l'attention. Il existe 9 espèces et de nombreuses mutations du plumage. Le genre "Agapornis" signifie "oiseau amoureux" en grec.

Alimentation conseillée

Il est déconseillé de nourrir les inséparables uniquement avec des graines. De même les « gâteaux pour oiseaux », à base de gras et de sucre (miel...) sont à proscrire. Les graines créent des carences en vitamines A, D, E, K, en calcium, en acides aminés essentiels (lysine, méthionine). Cela les prédispose aux infections respiratoires, diminue leur système immunitaire, peut provoquer des impactions et des abcès de la glande située au-dessus de la queue (glande uropygienne), et donne un plumage terne. Les femelles carencées en calcium peuvent faire des rétentions d'œufs potentiellement mortelles. **Rappelons que les femelles peuvent pondre même en l'absence de mâle (comme les poules !).**

Il est conseillé de proposer tous les jours des légumes et des fruits variés aux oiseaux (lanières de carottes, morceaux de pomme, raisins...) et de les renouveler fréquemment dans la cage. **La base de l'alimentation devrait être constituée de granulés complets** pour oiseaux (équivalent de « croquettes » qui ressemblent à du biscuit). Il est plus difficile d'introduire cette nourriture si l'oiseau a été habitué à manger des graines (plus grasses, donc plus attirantes).



Comment différencier le mâle de la femelle ?

Il n'existe pas de moyen visuel pour différencier le mâle de la femelle, hormis durant la période de reproduction : la femelle déchire du papier et en met des lanières dans sa queue pour les transporter et faire son nid avant de pondre. Certains disent que les mâles sont plus affectueux, tandis que les femelles ont un caractère bien trempé, mais ce n'est pas démontré scientifiquement. **L'écartement des os du bassin de la femelle est plus large que chez le mâle pour laisser passer les œufs.** Mais les seules techniques fiables pour sexer les inséparables sont le sexage ADN (sur un plume ou du sang) et l'endoscopie (petite caméra introduite dans le ventre de l'oiseau).

Soins préventifs

Il n'y a pas de vaccin annuel obligatoire à faire chez les inséparables. Toutefois, il est important **de vérifier à l'achat que votre oiseau n'est pas porteur d'une bactérie** transmissible à l'homme (Chlamydia). Cette bactérie se détecte grâce à une prise de sang, qui peut être effectuée chez votre vétérinaire en même temps qu'un sexage.

Certains inséparables sont porteurs sains de virus contagieux pour les congénères. **Il est important de dépister ces pathogènes si vous introduisez un inséparable dans une colonie**, et d'effectuer une quarantaine d'un mois. Si vous décidez de faire reproduire vos oiseaux, assurez-vous que leur état de santé le permet. **Il est conseillé de consulter un vétérinaire avant de se lancer dans la reproduction.**